

Questão 3-A. A região R está contida no primeiro quadrante e é limitada pela curva


$$y = 1 + \frac{x^2}{2}$$

e pela reta normal a essa curva no ponto $(2, 3)$.

a) (2,0 pontos) Calcule o perímetro de R .

b) (1,5 pontos) Determine o volume do sólido gerado pela rotação de R em torno do eixo Ox .

Solução. Sejam $f(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$, $O = (0, 0)$, $B = (2, 3)$ e $C = (0, 1)$. A reta normal à curva $y = f(x)$ no ponto $(2, 3)$ tem equação $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 2)$ e, portanto, o ponto em que a normal corta o eixo Ox é $A = (8, 0)$.



a) O perímetro de R é dado por

$$\begin{aligned} p &= \overline{OC} + \overline{OA} + \overline{AB} + \text{arco } CB \\ &= 1 + 8 + 3\sqrt{5} + \int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx. \end{aligned}$$

Para calcular a última integral, usamos a mudança de variável $x = \operatorname{tg} \theta$ e depois integramos por partes:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1+x^2} dx &= \int \sec^3 \theta dx = \int \sec \theta (1 + \operatorname{tg}^2 \theta) d\theta = \ln |\sec \theta + \operatorname{tg} \theta| + \int \operatorname{tg} \theta \operatorname{tg} \theta \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \operatorname{tg} \theta| + \operatorname{tg} \theta \sec \theta - \int \sec^3 \theta d\theta. \end{aligned}$$

Segue então que

$$\int \sec^3 \theta d\theta = \frac{1}{2} [\ln |\sec \theta + \operatorname{tg} \theta| + \operatorname{tg} \theta \sec \theta]$$

e, portanto,

$$\begin{aligned} p &= 1 + 8 + 3\sqrt{5} + \int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx \\ &= 9 + 3\sqrt{5} + \frac{1}{2} \left[\ln |x + \sqrt{1+x^2}| + x\sqrt{1+x^2} \right]_0^2 \\ &= 9 + 3\sqrt{5} + \frac{1}{2} [\ln(2 + \sqrt{5}) + 2\sqrt{5}] \\ &= 9 + 4\sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln(2 + \sqrt{5}) \end{aligned}$$

b) O volume do sólido gerado pela rotação de R em torno do eixo Ox é

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^2 dx + \pi \int_2^8 \left(-\frac{x}{2} + 4\right)^2 dx \\ &= \pi \int_0^2 \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{4}\right) dx + \pi \int_2^8 \left(16 - 4x + \frac{x^2}{4}\right) dx \\ &= \pi \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{20}\right) \Big|_0^2 + \pi \left(16x - 2x^2 + \frac{x^3}{12}\right) \Big|_2^8 \\ &= \pi \left[2 + \frac{8}{3} + \frac{8}{5} + 128 - 128 + \frac{128}{3} - 32 + 8 - \frac{2}{3}\right] \\ &= \frac{364\pi}{15}. \end{aligned}$$