

LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - MATEMÁTICA 3 (CCM0213)

PROF: PEDRO T. P. LOPES WWW.IME.USP.BR/~PPLOPES/MATEMATICA3

Os exercícios a seguir foram selecionados do livro do Apostol e do Domingues, Callioli, Costa.

Exercício 1. (Apostol seção 1.5 exercícios 1, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 25)

Para os itens a) até g), considere os seguintes subconjuntos das funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ com a operação de soma entre funções e multiplicação por escalar definidas de maneira usual. Quais dos conjuntos abaixo são espaços vetoriais?

- a) Conjunto das funções da forma $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, em que P e Q são polinômios e Q não tem raízes reais.
- b) Conjunto das funções que satisfazem: $f(1) = 1 + f(0)$.
- c) Conjunto das funções tais que: $f(x) = f(-x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
- d) Conjunto das funções tais que: $f(x) = -f(-x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
- e) Conjunto das funções tais que: $f(x + 2\pi) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
- f) Conjunto das funções tais que: $\int_0^1 f(x) dx \geq 0$.
- g) Conjunto das soluções do problema: $\frac{d^2f}{dx^2}(x) + P(x) \frac{df}{dx}(x) + Q(x)f(x) = 0$, em que P e Q são funções contínuas.

Para o item h), considere o seguinte subconjunto de \mathbb{R}^3 com a operação de soma e multiplicação por escalar definidas de maneira usual. Ele é um espaço vetorial?

- h) Conjunto dos elementos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tais que $3x + 4y = 1$, $z = 0$.

Exercício 2. (Apostol seção 1.5 exercício 31)

Considere o conjunto \mathbb{R}^2 com a operação de soma e multiplicação por escalar definidas abaixo. Quando as operações abaixo definem espaços vetoriais? Se não definirem, justifique.

- a) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$ a $(x_1, x_2) = (ax_1, 0)$.
- b) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, 0)$ a $(x_1, x_2) = (ax_1, ax_2)$.
- c) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1, x_2 + y_2)$ a $(x_1, x_2) = (ax_1, x_2)$.
- d) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (|x_1 + y_1|, |x_2 + y_2|)$ a $(x_1, x_2) = (|ax_1|, |ax_2|)$.

Exercício 3. (Apostol seção 1.10 exercícios 1 a 10) Quais dos seguintes subconjuntos $S \subset \mathbb{R}^3$ são subespaços vetoriais? Determine a dimensão, quando forem subespaços. Denotamos os elementos de \mathbb{R}^3 por (x, y, z) .

- 1. $x = 0$
- 2. $x + y = 0$
- 3. $x + y + z = 0$
- 4. $x = y$
- 5. $x = y = z$.
- 6. $x = y$ ou $x = z$.
- 7. $x^2 - y^2 = 0$
- 8. $x + y = 1$.
- 9. $y = 2x$ e $z = 3x$.
- 10. $x + y + z = 0$ e $x - y - z = 0$.

Exercício 4. (Apostol seção 1.10 exercícios 11 a 20) Quais dos subconjuntos dos polinômios de ordem $\leq n$, isto é, de $\mathcal{P}_n = \{a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n, a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$, são subespaços vetoriais? Determine a dimensão dos que forem subespaços.

- 1. $f(0) = 0$.
- 2. $f'(0) = 0$.
- 3. $f''(0) = 0$.
- 4. $f(0) + f'(0) = 0$.
- 5. $f(0) = f(1)$.
- 6. $f(0) = f(2)$
- 7. $f(x) = f(-x)$
- 8. $f(x) = -f(-x)$
- 9. f tem grau menor ou igual a $k \leq n$ ou $f = 0$.

10. f tem grau k , em que $k < n$ ou $f = 0$.

Exercício 5. (Apostol seção 1.10 exercício 22) Seja $S \subset V$ e $T \subset V$ dois subconjuntos de V . Denotamos por $L(S)$ (analogamente por $L(T)$) o conjunto das combinações lineares de S , ou seja, dos elementos $a_1u_1 + \dots + a_ku_k$, em que $u_1, \dots, u_k \in S$, $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ e $k \in \mathbb{N}_0$. Mostre que

1. $S \subset L(S)$.
2. Se $S \subset T \subset V$ e T é um subespaço vetorial de V , então $L(S) \subset T$. (Isto é o que significa dizer que $L(S)$ é o menor subespaço de V que contém S).
3. S é um subespaço vetorial se, e somente se, $S = L(S)$.
4. Se $S \subset T \subset V$, então $L(S) \subset L(T) \subset V$.
5. Se S e T são subespaços vetoriais de V , então $S \cap T$ também é um subespaço de V .
6. Se S e T são subconjuntos de V , então $L(S \cap T) \subset L(S) \cap L(T)$.
7. Dê um exemplo de subconjuntos de V tais que $L(S \cap T) \neq L(S) \cap L(T)$.

Exercício 6. (Apostol seção 1.10 exercício 24) Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e $S \subset V$ um subespaço de V . Prove cada uma das seguintes afirmações:

- a) S é um espaço vetorial de dimensão finita, então $\dim(S) \leq \dim(V)$.
- b) $\dim(S) = \dim(V)$ se, e somente se, $S = V$.
- c) Toda base de S é parte de uma base de V .
- d) Uma base de V não contém necessariamente uma base de S . (Ache um exemplo)

Exercício 7. (Apostol seção 1.13 exercício 1) As funções $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definidas abaixo definem um produto interno? Justifique.

- a) $\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = \sum_{j=1}^n x_j |y_j|$.
- b) $\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = \left| \sum_{j=1}^n x_j y_j \right|$.
- c) $\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = \left(\sum_{j=1}^n x_j \right) \left(\sum_{k=1}^n y_k \right)$.
- d) $\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2 y_j^2}$.
- e) $\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = \sum_{j=1}^n (x_j + y_j)^2 - \sum_{j=1}^n x_j^2 - \sum_{j=1}^n y_j^2$.

Exercício 8. (Apostol seção 1.13 exercícios 3., 4., 5., 6.) Seja V um espaço vetorial com produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ e $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty[$ a norma que vem deste produto interno. Mostre que as seguintes afirmações são válidas:

- a) $\langle u, v \rangle = 0$ se, e somente se, $\|u + v\| = \|u - v\|$.
- b) $\langle u, v \rangle = 0$ se, e somente se, $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.
- c) $\langle u, v \rangle = 0$ se, e somente se, $\|u + cv\| \geq \|u\|$, para todo $c \in \mathbb{R}$.
- d) $\langle u + v, u - v \rangle = 0$ se, e somente se, $\|u\| = \|v\|$.

Exercício 9. (Apostol seção 1.13 exercício 10) Seja \mathcal{P}_n o espaço vetorial de todos os polinômios de grau menor ou igual a n . Definamos $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{P}_n \times \mathcal{P}_n \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

Mostre que:

- a) $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{P}_n \times \mathcal{P}_n \rightarrow \mathbb{R}$ define um produto interno.
- b) Calcule $\langle t, at + b \rangle$.
- c) Ache todos os polinômios ortogonais a t .

Exercício 10. (Apostol seção 1.13 exercício 11) Seja \mathcal{P} o espaço vetorial de todos os polinômios reais. Definamos $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{P} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\infty e^{-t} f(t) g(t) dt.$$

- a) Mostre que $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{P} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ define um produto interno.
- b) Mostre que $\langle t^m, t^n \rangle = (m+n)!$.
- c) Calcule $\langle (1+t)^2, 1+t^2 \rangle$.
- d) Ache todos os polinômios de ordem ≤ 1 que são ortogonais a $1+t$.

Exercício 11. (Apostol seção 1.13 exercício 12) Seja \mathcal{P}_n o espaço vetorial de todos os polinômios de grau menor ou igual a n . Verifique se $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{P}_n \times \mathcal{P}_n \rightarrow \mathbb{R}$ definidas abaixo definem um produto interno. Justifique.

- a) $\langle f, g \rangle = f(1)g(1)$.
- b) $\langle f, g \rangle = \left| \int_0^1 f(t)g(t)dt \right|$.
- c) $\langle f, g \rangle = \int_0^1 \frac{df}{dt}(t) \frac{dg}{dt}(t)dt$.
- d) $\langle f, g \rangle = \left(\int_0^1 f(t)dt \right) \left(\int_0^1 g(t)dt \right)$.

Exercício 12. (Apostol seção 1.13 exercício 15.) Seja V um espaço vetorial complexo com produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$. Mostre que as seguintes identidades são válidas:

- a) $\langle au, bv \rangle = a\bar{b}\langle u, v \rangle$.
- b) $\langle u, av + bw \rangle = \bar{a}\langle u, v \rangle + \bar{b}\langle u, w \rangle$.

Exercício 13. (Apostol seção 1.13 exercício 16.) Seja V um espaço vetorial com produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ e $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty[$ a norma que vem deste produto interno. Mostre as seguintes identidades são válidas:

- a) $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle$
- b) $\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 = 2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle$
- c) $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$

Exercício 14. (Apostol seção 1.17 exercício 1) Para cada um dos casos abaixo, ache uma base ortonormal para o subespaço de \mathbb{R}^3 gerado pelos vetores dados:

1. $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (1, 0, 1)$ e $u_3 = (3, 2, 3)$.
2. $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (-1, 1, -1)$, $u_3 = (1, 0, 1)$

Exercício 15. (Apostol seção 1.17 exercício 2) Para cada um dos casos abaixo, acho uma base ortonormal para o subespaço de \mathbb{R}^4 gerado pelos vetores dados:

1. $u_1 = (1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 1, 0)$, $u_3 = (0, 0, 1, 1)$ e $u_4 = (1, 0, 0, 1)$.
2. $u_1 = (1, 1, 0, 1)$, $u_2 = (1, 0, 2, 1)$ e $u_3 = (1, 2, -2, 1)$.

Exercício 16. (Apostol seção 1.17 exercício 4) Considere o conjunto de todos os polinômios com o produto interno $\langle u, v \rangle := \int_0^1 u(t)v(t)dt$. Prove que as funções

$$y_1(t) = 1, \quad y_2(t) = \sqrt{3}(2t - 1), \quad y_3(t) = \sqrt{5}(6t^2 - 6t + 1)$$

formam uma base ortonormal do conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2.

Exercício 17. (Apostol seção 1.17 exercício 9) Considere o conjunto das funções contínuas definidas no intervalo $[0, 2\pi]$, isto é, $C([0, 2\pi])$. Definamos o produto interno $\langle u, v \rangle := \int_0^{2\pi} u(t)v(t)dt$. Ache o vetor contido no subespaço gerado por $\{1, \sin(x), \cos(x)\}$ que melhor aproxima a função x .

Exercício 18. (Domingues, Callioli, Costa Capítulo 3 exercício 10 e 11)

Seja V um espaço vetorial e $\{u_1, \dots, u_k\} \subset V$ um conjunto linearmente independente.

1. Mostre que $\{a_1u_1, \dots, a_ku_k\}$ é linearmente independente, sempre que $a_j \neq 0$, para todo $j = 1, \dots, k$.
2. Mostre que $\{u_1 + au_j, u_2, u_3, \dots, u_k\}$ é linearmente independente, para todo $a \in \mathbb{R}$.

Exercício 19. (Domingues, Callioli, Costa Capítulo 6 exercícios 16 e 17) Usando a desigualdade de Cauchy Schwartz em \mathbb{R}^3 mostre que

1. Dados números reais a_1, a_2 e a_3 estritamente positivos, então a seguinte desigualdade é válida:

$$(a_1 + a_2 + a_3) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} \right) \geq 9.$$

2. Dados números reais estritamente positivos a, b e c tais que $a + b + c = 1$, então

$$\left(\frac{1}{a} - 1 \right) \left(\frac{1}{b} - 1 \right) \left(\frac{1}{c} - 1 \right) \geq 8.$$