

EXERCÍCIOS DA QUARTA QUINZENA

Escolha um (apenas um) dos dois exercícios abaixo para entregar até o dia **19 de maio**.

Problema 1. Resolva os itens a) e b) abaixo:

a) Ache a expansão em série de Fourier seno da função $f : [0, l] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1$, ou seja, ache constantes b_n , $n \geq 1$, tais que $1 = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{l} \right)$. Conclua que

$$Re^{-ct} = \sum_{n=1}^{\infty} Re^{-ct} b_n \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{l} \right).$$

b) Resolva o problema abaixo, procurando soluções da forma $u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n(t) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{l} \right)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) + Re^{-ct}, & (t, x) \in]0, \infty[\times]0, l[\\ u(t, 0) = u(t, l) = 0, & t \geq 0 \\ u(0, x) = 0, & x \in]0, l[\end{cases}.$$

Problema 2. Resolva os itens a) e b) abaixo:

a) Ache uma solução $u_0 : [0, l] \rightarrow \mathbb{R}$ de

$$\begin{cases} \frac{d^2 u_0}{dx^2}(x) = \frac{g}{c^2}, & x \in]0, l[\\ u_0(0) = u_0(l) = 0 \end{cases},$$

em que g e c^2 são constantes.

b) Resolva o problema abaixo. Para tanto, suponha que a função u seja uma solução do problema. Determine a função $v(t, x) = u(t, x) - u_0(x)$ e obtenha u a partir de u_0 e v .

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t, x) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) - g, & (t, x) \in]0, \infty[\times]0, l[\\ u(t, 0) = u(t, l) = 0, & t \geq 0 \\ u(0, x) = 0, & x \in]0, l[\\ \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = 0, & x \in]0, l[\end{cases}.$$