

Q1. Sejam V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, S um subespaço de V e $v, w \in V$ tais que $v - w \in S$ e $w \in S^\perp$. Pode-se afirmar que:

- (a) $v \in S^\perp$;
- (b) $\langle v, w \rangle = \|v\|$;
- (c) $\langle v, w \rangle = 0$;
- (d) $\langle v, w \rangle = \|w\|^2$;
- (e) $v = 0$.

Q2. Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e considere as seguintes afirmações:

(I) para quaisquer $v, w \in V$, vale que:

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2(\|v\|^2 + \|w\|^2);$$

(II) para quaisquer $v, w \in V$, vale que v é ortogonal a w se, e somente se, $\|v + w\| = \|v - w\|$;

(III) se S_1 e S_2 são subespaços de V tais que $S_1 \subset S_2$, então $S_1^\perp \subset S_2^\perp$.

Assinale a alternativa correta:

- (a) apenas as afirmações (II) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (b) apenas as afirmações (I) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (c) apenas as afirmações (I) e (II) são necessariamente verdadeiras;
- (d) todas as afirmações são necessariamente verdadeiras;
- (e) apenas a afirmação (I) é necessariamente verdadeira.

Q3. Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por:

$$\langle p, q \rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1), \quad p, q \in P_2(\mathbb{R}).$$

Se

$$S = [2 + t - t^2, -3 + t^2]$$

e $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $1 + at + bt^2 \in S^\perp$, então $a + b$ é igual a:

- (a) $-\frac{3}{2}$;
- (b) $-\frac{1}{2}$;
- (c) -4 ;
- (d) -2 ;
- (e) $\frac{1}{2}$.

Q4. Seja W um subespaço de \mathbb{R}^3 de dimensão 2 e seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por:

$$T(x, y, z) = (-x - 2y - 3z, x + 2y + 3z, 3x + 6y + 9z), \quad x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Considere as seguintes afirmações:

- (I) existe um vetor $v \neq 0$ em $\text{Ker}(T) \cap W$;
- (II) existe um vetor $v \neq 0$ em $\text{Im}(T) \cap W$;
- (III) $T(T(v)) = T(v)$, para todo $v \in \mathbb{R}^3$.

Assinale a alternativa correta:

- (a) nenhuma das afirmações é necessariamente verdadeira;
- (b) apenas a afirmação (II) é necessariamente verdadeira;
- (c) apenas as afirmações (I) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (d) apenas a afirmação (I) é necessariamente verdadeira;
- (e) apenas as afirmações (I) e (II) são necessariamente verdadeiras.

Q5. Seja $T : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ a transformação linear definida por:

$$T(a + bt + ct^2 + dt^3) = \begin{pmatrix} a + d & b - c \\ c + d & a - b \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Assinale a alternativa correta:

- (a) T é injetora;
- (b) $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$;
- (c) $\dim(\text{Im}(T)) = 3$;
- (d) T é sobrejetora;
- (e) $\dim(\text{Im}(T)) < \dim(\text{Ker}(T))$.

Q6. Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Considere as seguintes afirmações:

- (I) se T é injetora, então $\dim(V) \leq \dim(W)$;
- (II) se $\dim(V) \leq \dim(W)$, então T é injetora;
- (III) se T é sobrejetora, então $\dim(V) \geq \dim(W)$.

Assinale a alternativa correta:

- (a) apenas as afirmações (I) e (II) são necessariamente verdadeiras;
- (b) apenas as afirmações (I) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (c) apenas as afirmações (II) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (d) todas as afirmações são necessariamente verdadeiras;
- (e) apenas a afirmação (II) é necessariamente verdadeira.

Q7. Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e considere as seguintes afirmações:

- (I) se $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ é uma base de V e se $v \in V$ é tal que $\langle v, e_i \rangle = 0$, para $i = 1, 2, \dots, n$, então $v = 0$;
- (II) se S é um subespaço de V e se $e_1, e_2, \dots, e_m \in S$ são vetores dois a dois distintos tais que $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ é uma base de S , então

$$\text{proj}_S v = \text{proj}_{e_1} v + \text{proj}_{e_2} v + \dots + \text{proj}_{e_m} v,$$

para qualquer $v \in V$;

- (III) se $v, w \in V$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $v \neq 0$ e $\lambda \neq 0$, então:

$$\text{proj}_{\lambda v} w = \lambda \text{proj}_v w.$$

Assinale a alternativa correta:

- (a) todas as afirmações são necessariamente verdadeiras;
- (b) apenas as afirmações (II) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (c) apenas a afirmação (I) é necessariamente verdadeira;
- (d) apenas as afirmações (I) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (e) apenas as afirmações (I) e (II) são necessariamente verdadeiras.

Q8. Sejam V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e S um subespaço de V . Se $v \in V$, $w \in S^\perp$ e $z \in S$ são vetores não nulos tais que $v = 4w + 7z$, então o vetor de S mais próximo de v é:

- (a) z ;
- (b) $-7z$;
- (c) $\text{proj}_w v$;
- (d) $v - \text{proj}_z v$;
- (e) $7z$.

Q9. Considere o espaço vetorial \mathbb{R}^4 munido do seu produto interno usual e seja S o subespaço de \mathbb{R}^4 definido por:

$$S = [(2, 1, -1, 2), (-1, 2, -2, -1)].$$

Se $v \in S$ e $w \in S^\perp$ são tais que

$$(6, -4, 2, 2) = v + w$$

e se $w = (a, b, c, d)$, então $a + b + c + d$ é igual a:

- (a) 8;
- (b) 2;
- (c) -4;
- (d) -6;
- (e) -2.

Q10. Considere a função $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definida por:

$$\langle p, q \rangle = p'(0)q'(0) + p'(1)q'(1) + p'(2)q'(2) + p'(3)q'(3), \quad p, q \in P_3(\mathbb{R}).$$

Assinale a alternativa correta:

- (a) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ não é um produto interno em $P_3(\mathbb{R})$, pois existe $p \in P_3(\mathbb{R})$ não nulo tal que $\langle p, p \rangle = 0$;
- (b) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ não é um produto interno em $P_3(\mathbb{R})$, pois existem $p, q \in P_3(\mathbb{R})$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que $\langle \lambda p, q \rangle \neq \lambda \langle p, q \rangle$;
- (c) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ não é um produto interno em $P_3(\mathbb{R})$, pois existem $p, q, r \in P_3(\mathbb{R})$ tais que $\langle p + q, r \rangle \neq \langle p, r \rangle + \langle q, r \rangle$;
- (d) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é um produto interno em $P_3(\mathbb{R})$;
- (e) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ não é um produto interno em $P_3(\mathbb{R})$, pois existem $p, q \in P_3(\mathbb{R})$ tais que $\langle p, q \rangle \neq \langle q, p \rangle$.

Q11. Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e considere as seguintes afirmações:

- (I) para quaisquer $v, w \in V$, vale que $\|v + w\| = \|v\| + \|w\|$ se, e somente se, v e w são linearmente dependentes;
- (II) para quaisquer $v, w \in V$, vale que $|\langle v, w \rangle| = \|v\|\|w\|$ se, e somente se, $v = 0$ ou existe $\lambda \geq 0$ tal que $w = \lambda v$;
- (III) para quaisquer $v, w \in V$ e qualquer subespaço S de V , vale que se $\langle v, w \rangle = 0$ e $w \in S^\perp$, então $v \in S$.

Assinale a alternativa correta:

- (a) apenas a afirmação (I) é necessariamente verdadeira;
- (b) nenhuma das afirmações é necessariamente verdadeira;
- (c) todas as afirmações são necessariamente verdadeiras;
- (d) apenas as afirmações (I) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (e) apenas as afirmações (II) e (III) são necessariamente verdadeiras.

Q12. Considere o espaço vetorial \mathbb{R}^4 munido do seu produto interno usual e seja $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ uma base de \mathbb{R}^4 . Suponha que $\mathcal{C} = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ seja a base ortogonal obtida a partir de \mathcal{B} pela aplicação do processo de ortogonalização de Gram–Schmidt. Se $v_4 = (-1, 3, 1, 1)$ e $w_4 = (-2, 1, 0, 1)$, então $\text{proj}_{[w_1, w_2, w_3]} v_4$ é igual a:

- (a) $(2, 1, 1, 3)$;
- (b) $(1, 1, 2, 1)$;
- (c) $(0, 1, 1, -1)$;
- (d) $(1, 2, 1, 0)$;
- (e) $(-1, 2, -1, -4)$.

Q13. Sejam $n \geq 1$ um inteiro, V um espaço vetorial de dimensão n munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ com $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ não nulos e dois a dois distintos. Considere as seguintes afirmações:

- (I) se o conjunto \mathcal{B} é ortogonal, então \mathcal{B} é uma base de V ;
- (II) se \mathcal{B} é uma base de V , então o conjunto \mathcal{B} é ortogonal;
- (III) o conjunto \mathcal{B} é ortogonal se, e somente se, a matriz

$$\begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_2, v_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \langle v_n, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

tem determinante positivo.

Assinale a alternativa correta:

- (a) apenas as afirmações (I) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (b) apenas as afirmações (I) e (II) são necessariamente verdadeiras;
- (c) apenas a afirmação (I) é necessariamente verdadeira;
- (d) apenas a afirmação (III) é necessariamente verdadeira;
- (e) apenas a afirmação (II) é necessariamente verdadeira.

Q14. Seja $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por:

$$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a - b + c - d, a - b, c - d), \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Assinale a alternativa correta:

- (a) $\text{Ker}(T) = \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\right]$;
- (b) $\dim(\text{Ker}(T)) = 3$;
- (c) T é sobrejetora;
- (d) $\text{Im}(T) = \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right]$;
- (e) $\dim(\text{Ker}(T)) = 1$.

Q15. Considere o espaço vetorial $P(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por:

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt, \quad p, q \in P(\mathbb{R}).$$

Se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $q(t) = a + bt$ é o elemento de $P_1(\mathbb{R})$ mais próximo de $p(t) = t^4$, então $a + b$ é igual a:

- (a) 1;
- (b) $\frac{1}{5}$;
- (c) $\frac{3}{5}$;
- (d) $\frac{2}{5}$;
- (e) $\frac{4}{5}$.

Q16. Sejam V um espaço vetorial de dimensão 2 e $T : V \rightarrow V$ uma transformação linear não nula tal que

$$T(T(v)) = 0,$$

para todo $v \in V$. Considere as seguintes afirmações:

- (I) $\dim(\text{Ker}(T)) = 1$;
- (II) $\dim(\text{Im}(T)) = 2$;
- (III) $\text{Im}(T) = \text{Ker}(T)$.

Assinale a alternativa correta:

- (a) apenas a afirmação (I) é necessariamente verdadeira;
- (b) apenas as afirmações (II) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (c) apenas as afirmações (I) e (II) são necessariamente verdadeiras;
- (d) apenas as afirmações (I) e (III) são necessariamente verdadeiras;
- (e) apenas a afirmação (II) é necessariamente verdadeira.