

Nível descritivo

e

Teste de Hipóteses

para a média populacional μ

Exemplo 1: Pelo Anuário do *IBGE* de 2010, a proporção de analfabetos em uma cidade era de 15%. Em 2015, entre 200 entrevistados dessa cidade, 23 eram analfabetos. Esses dados suportam a tese de diminuição do analfabetismo na cidade de 2010 para 2015?

(0) Descrever parâmetro e (1) Estabelecer hipóteses

Sendo p a proporção populacional de analfabetos na cidade em 2015, as hipóteses de interesse são:

$$H_0 : p = 0,15$$

$$H_1 : p < 0,15$$

(Hipótese alternativa **unilateral**)

(2) Nível de significância: adotando $\alpha = 0,10$.

(3) Região crítica: $RC = \{\hat{p} \leq a\}$

$$0,10 = P(\hat{p} \leq a \mid p = 0,15) \cong P\left(Z \leq \frac{a - 0,15}{\sqrt{(0,15)(0,85) / 200}}\right)$$

Pela tabela da Normal, para $A(z)=0,90 \Rightarrow z = 1,28$, então

$$\frac{a - 0,15}{\sqrt{0,15 \times 0,85 / 200}} = -1,28 \Rightarrow a = 0,15 - 1,28 \sqrt{0,15 \times 0,85 / 200} \cong 0,118.$$

Logo $a = 0,118$ e $RC = \{\hat{p} \leq 0,118\}$

(4) A evidência na amostra.

Observou-se $\hat{p}_{obs} = \frac{23}{200} = 0,115$

(5) Decisão e conclusão.

$\hat{p}_{obs} = 0,115 \in RC \Rightarrow$ rejeita-se H_0 ao nível de 10%.

Conclui-se que a taxa de analfabetismo diminuiu.

Pergunta: qual seria a conclusão se fosse adotado $\alpha = 5\%$?

E para $\alpha = 2\%$? Ou para $\alpha = 1\%$?

para $\alpha = 5\%$, $RC = \{ \hat{p} \leq 0,109 \} \Rightarrow$ não rejeita H_0

para $\alpha = 2\%$, $RC = \{ \hat{p} \leq 0,098 \} \Rightarrow$ não rejeita H_0

Sugestão: introduzir uma medida da força da evidência amostral contra H_0 , que é denominado **nível descritivo** ou **valor P**.

NÍVEL DESCRITIVO: P (ou valor P)

O nível descritivo corresponde à probabilidade de se observar valores tão ou mais extremos (contra H_0) que o valor obtido na amostra, caso a **hipótese nula** H_0 seja verdadeira, ou seja,

P (valores mais extremos contra H_0 | H_0 é verdadeira)

No exemplo, valores tão ou mais extremos que o observado na amostra corresponde a

$$\{ \hat{p} \leq \hat{p}_{obs} \} \quad \text{com} \quad \hat{p}_{obs} = 0,115$$

então

$$P = P(\hat{p} \leq 0,115 \mid H_0 \text{ verdadeira}) = P(\hat{p} \leq 0,115 \mid p = 0,15)$$

$$\cong P\left(Z \leq \frac{0,115 - 0,15}{\sqrt{0,15(1 - 0,15) / 200}}\right) = P(Z \leq -1,39)$$

$$= 1 - A(1,39) = 1 - 0,9177 = 0,0823.$$

⇒ Essa probabilidade ***P*** mede a **força da evidência** contida nos dados, **contra a hipótese nula H_0** .

Como saber se essa evidência é suficiente para rejeitar H_0 ?

Se o valor P é “pequeno”, então é pouco provável observarmos valores iguais ou mais extremos que o da amostra, supondo a hipótese nula H_0 verdadeira. Logo, há indícios que a hipótese nula não seja verdadeira e, tendemos a rejeitá-la.

Para valores “não tão pequenos” de P , não fica evidente que a hipótese nula H_0 seja falsa, portanto, tendemos a não rejeitá-la.

Assim,

P “pequeno” \Rightarrow rejeitamos H_0

P “não pequeno” \Rightarrow não rejeitamos H_0

Quão “pequeno” deve ser o valor de P para rejeitarmos H_0 ?

O limite de “quão pequeno” o valor de P deve ser para rejeitar a hipótese nula é o nível de significância α , de modo que,

$$P \leq \alpha \Rightarrow \text{rejeita-se } H_0$$
$$P > \alpha \Rightarrow \text{não rejeita-se } H_0$$

Se $P \leq \alpha$, diz-se que a amostra forneceu evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula H_0 .

No exemplo, $P = 0,0823$.

(5) Decisão e conclusão.

Como $P < 0,10 \Rightarrow$ Decidir pela rejeição de H_0 .

Logo, **concluí-se** que há indícios suficientes para afirmar que a proporção de analfabetos em 2015 diminuiu em relação a 2010.

Observação:

Se fosse adotado

$\alpha = 5\%$, $P > 5\%$, então H_0 não é rejeitada.

$\alpha = 2\% \Rightarrow P > 2\%$, então H_0 não é rejeitada.

$\alpha = 1\% \Rightarrow P > 1\%$, então H_0 não é rejeitada.

Observações:

- Quanto menor o **valor P** maior é a evidência contra a hipótese nula H_0 , contida nos dados.
- Quanto menor o nível de significância α fixado, mais forte deve ser a evidência contra a hipótese nula, para que ela seja rejeitada.
- Quando a hipótese nula é rejeitada para o nível de significância α fixado, diz-se também que a amostra é **significante** ao nível de significância α .
- O nível descritivo P (**valor P**) é o menor nível de significância para o qual a hipótese nula H_0 é rejeitada.

Exemplo 2: (moeda) Se em 100 arremessos independentes de uma moeda observarmos 65 caras, podemos afirmar que a moeda não é honesta?

(1) Estabelecer hipóteses (e (0) descrever parâmetro)

Sendo p a probabilidade de “cara” da moeda, as hipóteses de interesse são

$H_0: p = 0,5$ a moeda é **honest**a

$H_1: p \neq 0,5$ a moeda é **desequilibrada**

(Hipótese alternativa **bilateral**)

(2) Fixar nível de significância

Por exemplo, $\alpha = 0,05$.

(3) Observar a evidência na amostra

Observamos 65 caras em 100 arremessos $\Rightarrow \hat{p}_{obs} = 0,65$

(4) Determinar o nível descritivo ou valor P

Se a moeda for honesta (H_0 verdadeira) $\Rightarrow p = 0,5$.

Observa-se um desvio de $|0,65 - 0,50| = 0,15$.

Então, valores mais extremos corresponde a

$$\begin{aligned} P &= P(\hat{p} \geq 0,65 \text{ ou } \hat{p} \leq 0,35 \mid p = 0,5) = \\ &P(\hat{p} \geq 0,65 \mid p = 0,5) + P(\hat{p} \leq 0,35 \mid p = 0,5) \end{aligned}$$

Assim, sob H_0 ($p = 0,5$), e pelo *TLC*

$$\hat{p} \sim N\left(0,5; \frac{0,5 \times 0,5}{100}\right) \Rightarrow Z = \frac{\hat{p} - 0,5}{\sqrt{0,25/100}} \sim N(0; 1)$$

Logo,

$$P \cong P\left(Z \geq \frac{0,65 - 0,5}{\sqrt{0,5(1 - 0,5) / 100}}\right) + P\left(Z \leq \frac{0,35 - 0,5}{\sqrt{0,5(1 - 0,5) / 100}}\right)$$

$$= P(Z \geq 3) + P(Z \leq -3) = 2 \times P(Z \geq 3) = 0,0027.$$

O **valor P** pequeno significa que o número de caras que foi observado dificilmente ocorre quando uma moeda honesta é lançada 100 vezes.

Isso nos leva a duvidar da honestidade da moeda. Logo, a conclusão abaixo procede.

(5) Decisão e conclusão

Como $P < \alpha$, decidimos rejeitar a hipótese nula H_0 , ao nível de significância de 5%.

Concluimos que há evidência suficiente para se afirmar que a moeda é desequilibrada, ao nível de significância de 5%.

RESUMO (via nível descritivo para p)

(0) Definir o parâmetro p a ser testado

(1) Estabelecer as **hipóteses**:

$H_0: p = p_0$ contra uma das alternativas

$H_1: p \neq p_0$, $H_1: p > p_0$ ou $H_1: p < p_0$.

(2) Fixar um **nível de significância** α .

(3) Na amostra, obter o valor \hat{p}

(4) Determinar o nível descritivo ou valor P

Se $H_1: p > p_0$, então $P = P(\hat{p} \geq \hat{p}_{obs} \mid p = p_0)$.

Se $H_1: p < p_0$, então $P = P(\hat{p} \leq \hat{p}_{obs} \mid p = p_0)$.

Se $H_1: p \neq p_0$, então $P = 2 \times P(\hat{p} \leq \hat{p}_{obs} \mid p = p_0)$, se $\hat{p}_{obs} < p_0$,
 $P = 2 \times P(\hat{p} \geq \hat{p}_{obs} \mid p = p_0)$, se $\hat{p}_{obs} > p_0$.

(5) Decidir,

comparando P com o nível de significância α ,

$P \leq \alpha \Rightarrow$ rejeita-se H_0

$P > \alpha \Rightarrow$ não rejeita-se H_0

e **concluir** com respeito à situação.

Teste de hipóteses para a média populacional μ

Exemplo 3:

Em períodos de pico, os clientes de um banco são obrigados a enfrentar longas filas para sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Dados históricos de vários anos de operação indicam que o tempo de transação nesses caixas tem distribuição normal com média igual a 270 segundos e desvio padrão igual a 32 segundos.

Para aliviar essa situação o banco resolve instalar, em caráter experimental, alguns caixas eletrônicos de concepção mais avançada. Após o período de experiência, o banco pretende examinar uma amostra casual simples e analisar o tempo médio das transações realizadas nos novos caixas eletrônicos.

Que tipo de informação o banco pretende obter com esse conjunto de dados?

Obviamente, ele deseja obter informação que dê suporte à conjectura de que o *tempo médio de transação nas novas máquinas seja inferior a 270 segundos*.

Isto serviria como base objetiva para a decisão de substituir as máquinas atuais pelas novas.

→ Em *linguagem estatística*, o que o banco precisa é conduzir um *teste de hipóteses para o tempo médio μ de transação nas novas máquinas*.

As etapas a serem cumpridas para este teste de hipóteses são as mesmas que vistas anteriormente.

(0) Descrever a variável de interesse e parâmetro a ser testado

(1) Formular as hipóteses nula H_0 e a alternativa H_1

Hipótese Nula: afirmação ou conjectura sobre μ contra a qual estaremos buscando evidência nos dados amostrais.

Hipótese Alternativa: afirmação ou conjectura sobre μ que suspeitamos (ou esperamos) ser verdadeira.

(2) Fixar o nível de significância α do teste.

(3) Coletar os dados e calcular as medidas necessárias:

média amostral \bar{x}_{obs} e, se necessário, desvio padrão amostral s .

(4) Calcular o nível descritivo P

P mede a força da evidência contra a hipótese nula contida nos dados.

Nota: O teste será realizado com base no nível descritivo, uma vez que, na prática, é amplamente utilizado.

(5) Tomar a decisão e concluir.

Comparar o valor de P com o nível de significância α adotado.

→ Se $P \leq \alpha$ reconhecemos na amostra evidência suficiente para rejeitar H_0 , isto é, consideramos a amostra **significante** ao nível α .

→ Caso contrário, não rejeitamos H_0 .

No Exemplo 3, assumindo que a nova máquina **não altere o desvio padrão** (populacional), isto é, $\sigma_{\text{nova}} = \sigma_{\text{atual}}$, temos que

(0) Variável de interesse e parâmetro a ser testado

X = tempo de transação na nova máquina

μ = tempo **médio** de transação na nova máquina

$\Rightarrow X$ é normal com média μ , desconhecida, e $\sigma=32$

(1) Hipóteses nula e alternativa

H_0 : tempo médio da máquina nova não é menor que o da atual

H_1 : tempo médio da máquina nova é menor que o da atual

$$H_0: \mu = 270 \text{ seg} \quad \text{e} \quad H_1: \mu < 270 \text{ seg}$$

(2) Nível de significância: $\alpha = 5\%$

(3) Amostra

Tempos (em seg) de 61 transações escolhidas ao acaso

240 245 286 288 238 239 278 287 291 248 257 225
...
250 268 275 271 290 260 254 282 263 256 278 270

Valor observado da média amostral:

$$\bar{x}_{obs} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{61}}{61} = 262,3$$

(4) Cálculo do nível descritivo P

Como visto, o nível descritivo mede a probabilidade de se observar valores mais extremos do que o encontrado na amostra, supondo que a hipótese nula seja verdadeira, isto é,

$$\begin{aligned} P &= P(\bar{X} \leq \bar{x}_{\text{obs}} \mid H_0 \text{ verdadeira}) \\ &= P(\bar{X} \leq 262,3 \mid \mu = 270) \end{aligned}$$

Para calcular essa probabilidade, precisamos conhecer a distribuição amostral de \bar{X} e utilizar uma padronização adequada.

RESULTADOS:

- Se $X \sim N(\mu; \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ para qualquer n .

Então usamos a padronização $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim N(0, 1)$

ou a padronização $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}} \sim t_{n-1}$,

- X tem média μ e variância σ^2 e n é grande $\Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

Então $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim N(0, 1)$ e $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}} \sim N(0, 1)$

Então, nesse exemplo,

$$\begin{aligned} P &= P(\bar{X} \leq \bar{x}_{obs} \mid H_0 \text{ verdadeira}) \\ &= P(\bar{X} \leq 262,3 \mid \mu = 270) \\ &= P\left(Z \leq \frac{262,3 - 270}{\sqrt{32^2 / 61}}\right) = P(Z \leq -1,88) = 0,03 \end{aligned}$$

(5) Tomar a decisão e concluir.

Como $P = 0,03 < 0,05$, rejeitamos H_0 ao nível de significância adotado. Concluimos que o tempo médio de transação das máquinas novas é menor que o das atuais.

No Exemplo 3, suponha que a nova máquina possa **alterar o desvio padrão**. Então o desvio padrão σ_{nova} do tempo das novas máquinas agora é desconhecido.

$\Rightarrow X$ é normal com μ e σ desconhecidos.

(1) Hipóteses nula e alternativa

$$H_0: \mu = 270 \text{ seg} \quad \text{e} \quad H_1: \mu < 270 \text{ seg}$$

(2) Nível de significância $\alpha = 5\%$

(3) Amostra

Valor observado da média amostral: $\bar{x}_{obs} = 262,3$

Valor observado do desvio padrão amostral: $s = 31,4$

(4) Cálculo do Nível Descritivo

$$\begin{aligned} P &= P(\bar{X} \leq 262,3 \mid \mu = 270) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}} \leq \frac{262,3 - 270}{\sqrt{31,4^2/61}}\right) \\ &= P(T \leq -1,92) = 0,025, \end{aligned}$$

com $T \sim t_{60}$, pois X tem distribuição normal.

(5) Decisão e conclusão

Rejeitamos H_0 , pois $P \cong 0,025 < 0,05$.

Conclusão: Há evidência suficiente para que o banco substitua as máquinas atuais pelas mais modernas.

Exemplo 4:

Um fabricante de cigarros afirma que seus cigarros contêm, em média, não mais que 30 *mg* de nicotina.

Uma *ONG* anti-tabagismo não concorda com essa afirmação, e colhe uma amostra aleatória de 81 cigarros dessa marca para contestar a afirmação.

Na amostra coletada, o conteúdo médio de nicotina foi 31,1 *mg* e desvio padrão de 3,7 *mg*.

→ Esses resultados são suficientes para contestar a afirmação do fabricante?

(0) Variável e parâmetro:

X = conteúdo de nicotina dos cigarros desse fabricante

μ = conteúdo médio de nicotina dos cigarros

(1) As hipóteses nula e alternativa são

$$H_0: \mu = 30 \text{ mg}$$

$$H_1: \mu > 30 \text{ mg}$$

(2) Nível de significância $\alpha = 5\%$

(3) Evidência amostral

Tamanho da amostra: $n = 81$

Média amostral: $\bar{x}_{obs} = 31,1 \text{ mg}$

Desvio padrão amostral: $s = 3,7 \text{ mg}$

(4) Cálculo do nível descritivo P

A região crítica é da forma $RC = \{\bar{X} \geq k\}$

Portanto, o nível descritivo ou **valor P** é calculado por

$$\begin{aligned} P &= P(\bar{X} \geq 31,1 \mid \mu = 30) \\ &= P\left(T \geq \frac{\sqrt{81} (31,1 - 30)}{3,7}\right) \\ &= P(T \geq 2,675) \cong 0,0038 \quad (\text{tabela normal, pois } n \text{ é grande}) \end{aligned}$$

(5) Decisão e conclusão

Como $P \leq \alpha$, rejeitamos H_0 .

Logo, ao nível de 5%, há evidências suficiente para concluir que a afirmação do fabricante está incorreta. A contestação da *ONG* procede.

Exemplo 5: Uma empresa vende uma mistura de castanhas, em latinha, cuja embalagem afirma que, em média, 25 g do conteúdo total (em g) é de castanha de cajú.

Não interessa à empresa que se tenha menos castanha de cajú do que o especificado na embalagem, por uma questão de qualidade. Por outro lado, não se pode ter muito mais, por uma questão de custo.

Desconfiado de que o conteúdo médio de castanha de cajú esteja incorreto, o departamento de Garantia da Qualidade (*GQ*) resolve examinar o conteúdo de 12 latas, e medir a quantidade (em g) de castanha de caju em cada lata. A média amostral resultou em 26,3 g e desvio padrão de 3,1 g.

Este resultado constitui uma forte evidência em favor do *GQ*, ao nível de significância de 5% ?

Suposição: O conteúdo total de castanha de cajú por lata é uma *v. a.* Normal.

(0) Variável e parâmetro

X = conteúdo de castanha de cajú por lata

μ = conteúdo médio de castanha de cajú por lata

(1) As hipóteses nula e alternativa são

$$H_0: \mu = 25 \quad \text{e} \quad H_1: \mu \neq 25$$

(2) Nível de significância $\alpha = 5\%$

(3) Evidência amostral

Tamanho da amostra $n = 12$

Média amostral $\bar{x}_{obs} = 26,3 \text{ g}$

Desvio padrão amostral $s = 3,1 \text{ g}$

(4) Determinar o nível descritivo P (TESTE BILATERAL)

A região crítica deve ter a forma: $RC = \{\bar{X} \leq k_1 \text{ ou } \bar{X} \geq k_2\}$

Como $\bar{x}_{obs} = 26,3 > \mu_0 = 25$,

$$P = 2 \times P(\bar{X} \geq 26,3 \mid \mu = 25)$$

$$= 2 \times P\left(T \geq \frac{26,3 - 25}{\frac{3,1}{\sqrt{12}}}\right) = 2 \times P(T \geq 1,45) \cong 0,15$$

sendo $T \sim t_{11}$, pois X é normal.

(5) Decisão e conclusão

Como $P > \alpha$, decidimos **não rejeitar H_0** .

Concluimos, ao nível de significância de 5%, que não há evidências suficiente em favor do GQ .



→ Como encontrar P via R ?

The image shows the R Commander interface. The 'Distribuições' menu is open, showing various distribution options. The 'Distribuição t' option is selected, which has opened a sub-menu with 'Probabilidades da dist. t' highlighted. In the foreground, a dialog box titled 'Probabilidades da Dist. t' is open. It contains the following fields and options:

- Valores da Variável: 1.45
- Graus de liberdade: 11
- Cauda inferior:
- Cauda superior:
- Buttons: OK, Cancelar, Ajuda

Below the dialog box, the output of the R command is shown as $\Rightarrow [1] 0.087483$.

$$P = 2 \times 0,087483 = 0,174966 \approx 0,1750$$

RESUMO

Teste de hipóteses para a média populacional μ (via nível descritivo)

(0) Descrever a **variável** X e o **parâmetro** de interesse μ .

(1) Estabelecer as **hipóteses**:

$H_0: \mu = \mu_0$ contra uma das alternativas

$H_1: \mu \neq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$ ou $H_1: \mu < \mu_0$.

(2) Fixar um **nível de significância** α .

(3) Selecionar uma **amostra** casual simples de tamanho n

\Rightarrow determinar a média amostral \bar{x}_{obs} e, se necessário, o

desvio padrão amostral s .

(4) Determinar o **nível descritivo P**

$$\text{Se } H_1: \mu > \mu_0, \quad P = P(\bar{X} \geq \bar{x}_{obs} \mid \mu = \mu_0)$$

$$\text{Se } H_1: \mu < \mu_0, \quad P = P(\bar{X} \leq \bar{x}_{obs} \mid \mu = \mu_0)$$

$$\begin{aligned} \text{Se } H_1: \mu \neq \mu_0, \quad P &= 2 \times P(\bar{X} \geq \bar{x}_{obs} \mid \mu = \mu_0) \text{ se } \bar{x}_{obs} \geq \mu_0 \\ &= 2 \times P(\bar{X} \leq \bar{x}_{obs} \mid \mu = \mu_0) \text{ se } \bar{x}_{obs} \leq \mu_0 \end{aligned}$$

Lembrar que:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim N(0,1), \text{ se } X \text{ é normal ou } n \text{ é grande}$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}} \sim t_{n-1}, \text{ se } X \text{ é normal}$$


$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}} \sim N(0,1), \text{ se } n \text{ é grande}$$

(5) **Decidir**, comparando P com o nível de significância α , e **concluir** em termos do problema.

Se $P \leq \alpha \Rightarrow$ rejeita-se H_0

Se $P > \alpha \Rightarrow$ não rejeita-se H_0

Distribuição Normal : Valores de $P(Z \leq z) = A(z)$




Segunda decimal de z

Parte inteira e primeira decimal de z

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Tabela da distribuição *t*-Student



ν	A						
	.60	.70	.80	.85	.90	.95	.975
1	0.325	0.727	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706
2	0.289	0.617	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303
3	0.277	0.584	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182
4	0.271	0.569	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776
5	0.267	0.559	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571
6	0.265	0.553	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447
7	0.263	0.549	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365
8	0.262	0.546	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306
9	0.261	0.543	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262
10	0.260	0.542	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228
11	0.260	0.540	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201
12	0.259	0.539	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179
13	0.259	0.537	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160
14	0.258	0.537	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145
15	0.258	0.536	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131
16	0.258	0.535	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120
17	0.257	0.534	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110
18	0.257	0.534	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101
19	0.257	0.533	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093
20	0.257	0.533	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086
21	0.257	0.532	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080
22	0.256	0.532	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074
23	0.256	0.532	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069
24	0.256	0.531	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064
25	0.256	0.531	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060
26	0.256	0.531	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056
27	0.256	0.531	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052
28	0.256	0.530	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048
29	0.256	0.530	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045
30	0.256	0.530	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042
40	0.255	0.529	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021
60	0.254	0.527	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000
120	0.254	0.526	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980
∞	0.253	0.524	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960

ν	A						
	.98	.985	.99	.9925	.995	.9975	.9995
1	15.895	21.205	31.821	42.434	63.657	127.322	636.590
2	4.849	5.643	6.965	8.073	9.925	14.089	31.598
3	3.482	3.896	4.541	5.047	5.841	7.453	12.924
4	2.999	3.298	3.747	4.088	4.604	5.598	8.610
5	2.757	3.003	3.365	3.634	4.032	4.773	6.869
6	2.612	2.829	3.143	3.372	3.707	4.317	5.959
7	2.517	2.715	2.998	3.203	3.499	4.029	5.408
8	2.449	2.634	2.896	3.085	3.355	3.833	5.041
9	2.398	2.574	2.821	2.998	3.250	3.690	4.781
10	2.359	2.527	2.764	2.932	3.169	3.581	4.587
11	2.328	2.491	2.718	2.879	3.106	3.497	4.437
12	2.303	2.461	2.681	2.836	3.055	3.428	4.318
13	2.282	2.436	2.650	2.801	3.012	3.372	4.221
14	2.264	2.415	2.624	2.771	2.977	3.326	4.140
15	2.249	2.397	2.602	2.746	2.947	3.286	4.073
16	2.235	2.382	2.583	2.724	2.921	3.252	4.015
17	2.224	2.368	2.567	2.706	2.898	3.222	3.965
18	2.214	2.356	2.552	2.689	2.878	3.197	3.922
19	2.205	2.346	2.539	2.674	2.861	3.174	3.883
20	2.197	2.336	2.528	2.661	2.845	3.153	3.849
21	2.189	2.328	2.518	2.649	2.831	3.135	3.819
22	2.183	2.320	2.508	2.639	2.819	3.119	3.792
23	2.177	2.313	2.500	2.629	2.807	3.104	3.768
24	2.172	2.307	2.492	2.620	2.797	3.091	3.745
25	2.167	2.301	2.485	2.612	2.787	3.078	3.725
26	2.162	2.296	2.479	2.605	2.779	3.067	3.707
27	2.158	2.291	2.473	2.598	2.771	3.057	3.690
28	2.154	2.286	2.467	2.592	2.763	3.047	3.674
29	2.150	2.282	2.462	2.586	2.756	3.038	3.659
30	2.147	2.278	2.457	2.581	2.750	3.030	3.646
40	2.123	2.250	2.423	2.542	2.704	2.971	3.551
60	2.099	2.223	2.390	2.504	2.660	2.915	3.460
120	2.076	2.196	2.358	2.468	2.617	2.860	3.373
∞	2.054	2.170	2.326	2.432	2.576	2.807	3.291