

# MAT0146: Cálculo Diferencial e Integral I para Economia

## B0: Recordação

Prof. M Alexandrino (IME-USP)

2024

**Alerta:** Este é apenas um guia resumido de parte das transparências das aulas. Ele não substitui as aulas (onde existem discussões, resoluções de exercícios, figuras, etc) e não substitui a leitura da bibliografia recomendada. O GeoGebra <http://www.geogebra.org> (aqui utilizado) é uma ótima ferramenta, porém o aluno deve também tentar fazer as figuras a mão para compreendê-las melhor.

## Conceitos básicos

Sejam  $A, B$  conjuntos. Uma **função**  $f : A \rightarrow B$  é uma correspondência que a cada elemento  $x \in A$  associa um único elemento  $f(x) \in B$ .

$A$  é chamado **domínio**,  $B$  é chamado contra domínio (ou conjunto chegada) e  $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$  é chamado **imagem**.

Uma função  $f : A \rightarrow B$  é chamada **injetora** se  $f(x) = f(\tilde{x}) \Rightarrow x = \tilde{x}$

Uma função  $f : A \rightarrow B$  é chamada **sobrejetora** se  $\forall y \in B$  existe  $x \in A$  tal que  $f(x) = y$ .

Uma função  $f : A \rightarrow B$  é chamada **bijetora** se é sobrejetora e injetora. Neste caso existe uma **função inversa**  $f^{-1} : B \rightarrow A$  ou seja a **compostas** destas funções são identidade:

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ , } f(f^{-1}(y)) = y$$

Estaremos interessados no caso onde  $A$  e  $B$  são subconjuntos de  $\mathbb{R}$ , em particular em **intervalos**:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

Seja  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  função. Então o conjunto

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x), x \in I\}$$

é chamado **gráfico**

Ex: Sejam  $f : [0, 2] \rightarrow [0, 4]$  definida como  $f(x) = x^2$  e  $h : [0, 4] \rightarrow [0, 2]$  definida como  $h(x) = \sqrt{x}$





Figura: gráficos das funções  $f$  e  $h$ . Note que tais funções são inversas uma da outra, i.e.,  $h \circ f(x) = x$  e  $f \circ h(y) = y$


Seja  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função. Dizemos que  $f$  é **crescente** (resp. estritamente crescente) se  $f(x_1) \leq f(x_2)$  (resp.  $f(x_1) < f(x_2)$ ) para todo  $x_1 < x_2$ .

**Ex:** Função oferta clássica:  $f : [0, b) \rightarrow \mathbb{R}$  (quantidade X preço)




Seja  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função. Dizemos que  $f$  é **decrésciente** (resp. **estritamente decrésciente**) se  $f(x_1) \geq f(x_2)$  (resp.  $f(x_1) > f(x_2)$ ) para todo  $x_1 < x_2$ .

**Ex:(Função demanda clássica)**  $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  (quantidade X preço)





**Ex:(lei de Pareto da distribuição de renda)** Seja  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  função definida como  $f(x) = \frac{a}{x^b}$ . O valor  $f(x)$  mediria o número de indivíduos de uma dada população de tamanho  $a$  com renda acima de  $x$ . A constante  $b$  (parâmetro da população) em geral é tomada próximo a 1.5



## Equação da reta

$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = c\}$  é chamada **reta** e  $ax + by = c$  é chamada **equação da reta**. Uma reta  $x = c$  é chamada **reta vertical** e uma reta  $y = c$  é chamada **reta horizontal**.

Dado uma reta não vertical chamamos  $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$  **inclinação da reta**. Em particular  $y = m(x - x_1) + y_1$ .




Figura: reta **única** ligando (1, 3) a (3, 6)

**Obs** Por 2 pontos distintos em  $\mathbb{R}^2$  passa uma única reta.

**Prob:** Quando o preço for de R\$50,00 o fabricante consegue ofertar 50 produtos, ao passo que quando o produto custar R\$75,00 ele consegue ofertar 100 produtos. Supondo que a função oferta é modelada por uma reta, determine a função oferta  $f$ .

**Prob:** Considere  $f(q) = \frac{3}{2}q + 1$  a função **função oferta** e  $h(q) = 10 - 2q$  a função **demanda**. Determine o **ponto de equilíbrio** (i.e, a interseção do gráfico da **função oferta** com a **demanda**).

**Prob:** Quando o preço for de R\$50,00 o fabricante consegue ofertar 50 produtos, ao passo que quando o produto custar R\$75,00 ele consegue ofertar 100 produtos. Supondo que a função oferta é modelada por uma reta, determine a função oferta  $f$ .

**solução** Sejam  $(x_1, y_1) = (50, 50)$  e  $(x_2, y_2) = (100, 75)$ . Então:  
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{75 - 50}{100 - 50} = \frac{1}{2}$$
 Visto que  $y = m(x - x_1) + y_1$  temos que  
$$y = \frac{1}{2}(x - 50) + 50$$

**Prob:** Considere  $f(q) = \frac{3}{2}q + 1$  a função **função oferta** e  $h(q) = 10 - 2q$  a função **demanda**. Determine o **ponto de equilíbrio** (i.e, a interseção do gráfico da **função oferta** com a **demanda**).

**Solução:**  $\frac{3}{2}q_0 + 1 = p_0 = 10 - 2q_0$ . Assim  $q_0 = \frac{18}{7}$  e substituindo em (qualquer uma) das equações temos  $p_0 = \frac{34}{7}$ .




Figura:  $f(q) = \frac{3}{2}q + 1$  a função oferta,  $h(q) = 10 - 2q$  a função demanda e  $(q_0, p_0) = (\frac{18}{7}, \frac{34}{7})$  ponto de equilíbrio.

# Polinômios, deslocamentos, reflexão e módulo

Dizemos que uma função  $f$  é um polinômio de grau  $n$  se

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$

Em particular para  $f(x) = ax^2 + bx + c$  podemos determinar as raízes reais (quando estas existem) pela fórmula  $x_0 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$














A **função módulo**  $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$  é definida como  $|x| = \sqrt{x^2}$   
ou de forma equivalente:  $|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$

**Obs:**  $|a - b|$  mede a distância de  $a$  e  $b$  na reta.

**Prop:**  $|a + b| \leq |a| + |b|$ .



**Prob:** Resolva  $|x - 3| + |x + 2| < 11$

## solução

Primeiro deve-se compreender melhor as funções compostas:

$$f(x) = |x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{se } 3 \leq x \\ -x + 3 & \text{se } x < 3 \end{cases}$$


$$g(x) = |x + 2| = \begin{cases} x + 2 & \text{se } -2 \leq x \\ -x - 2 & \text{se } x < -2 \end{cases}$$

Assim a função  $h = f + g$  é

$$h(x) = |x - 3| + |x + 2| = \begin{cases} 2x - 1 & \text{se } 3 \leq x \\ 5 & \text{se } -2 \leq x < 3 \\ -2x + 1 & \text{se } x < -2 \end{cases}$$


- ▶ quando  $x \in (-\infty, -2)$  então  $h(x) < 11$  é satisfeita para  $x \in (-5, -2)$
- ▶ quando  $x \in [-2, 3)$  então  $h(x) < 11$  é satisfeita para  $x \in [-2, 3)$ .
- ▶ quando  $x \in [3, +\infty)$  então  $h(x) < 11$  é satisfeita para  $x \in [3, 6)$ .

Juntando os intervalos tempos **que o resultado é  $(-5, 6)$ .**



## Funções trigonométricas

Dado um círculo de raio  $r$  o ângulo  $\theta$  em **radianos** é tal que o comprimento do setor circular  $\mathcal{L}$  definido pelo ângulo  $\theta$  é  $\mathcal{L} = \theta \times r$ . Em particular o comprimento do círculo é  $2\pi r$ . As funções  $\cos(\theta)$  e  $\sin(\theta)$  são definidas (para  $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ) como o **cateto adjacente** ao ângulo e o **cateto oposto** ao ângulo de um triângulo retângulo com hipotenusa de tamanho 1, respectivamente; (sinal é dado pelo círculo trigonométrico). A **função tangente** é definida como  $\tan(x) = \text{tg}(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ .



Utilizando triângulo equilátero a seguir concluímos:

$$\sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$


$$\cos(\pi/3) = \frac{1}{2}$$

$$\tan(\pi/3) = \sqrt{3}$$

$$\sin(\pi/6) = \frac{1}{2}$$

$$\cos(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$






Utilizando triângulo retângulo isósceles a seguir concluímos:

$$\sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan(\pi/4) = 1$$






Figura: Gráfico da função  $f(x) = \cos(x)$




Figura: Gráfico da função  $f(x) = \sin(x)$







Figura: Gráfico da função  $f(x) = \tan(x)$

# Gráficos das funções inversas:



Algumas igualdades trigonométricas:

$$1 = \sin(\theta)^2 + \cos(\theta)^2$$

$$\cos(A + B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$$

$$\sin(A + B) = \sin(A)\cos(B) + \sin(B)\cos(A)$$

### Prob

- (1) Determine  $\cos^2(\theta)$  em termos de  $\cos(2\theta)$
- (2) Determine  $\sin^2(\theta)$  em termos de  $\cos(2\theta)$
- (3) Relacione  $\sec^2(\theta) = \left(\frac{1}{\cos(\theta)}\right)^2$  com  $\tan^2(\theta)$

## Soluções

$$\cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$$

$$\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$$

$$\sec^2(\theta) = 1 + \tan^2(\theta)$$

**Obs:** As igualdades acima (deduzidas das básicas anteriores) serão importantes por exemplo no processo de integração.