


XXVI OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
PRIMEIRA FASE – NÍVEL 3 (Ensino Médio)
GABARITO

GABARITO NÍVEL 3

1) D	6) D	11) C	16) C	21) B
2) D	7) B	12) B	17) B	22) A
3) C	8) C	13) B	18) E	23) D
4) D	9) A	14) D	19) B	24) C
5) D	10) B	15) E	20) B	25) D

1. **(D)** $f(4) = 5; f(f(4)) = f(5) = 2; f(f(f(4))) = f(2) = 1; f(f(f(f(4)))) = f(1) = 4$.
 Logo, como 2004 é múltiplo de 4, $f(\underbrace{f(\dots(f(f(4))\dots))}_{2004 \text{ vezes}}) = 4$

2. **(D)**



Sendo G a projeção ortogonal de E sobre o segmento DF , então $EG = 7$.
 Como AEB é um triângulo retângulo em E ,
 $EC^2 = AC \cdot CB \Leftrightarrow EC^2 = 1 \cdot 25 \Leftrightarrow EC = 5$.
 Como AFB é um triângulo retângulo em F ,
 $DF^2 = AD \cdot DB \Leftrightarrow DF^2 = 8 \cdot 18 \Leftrightarrow DF = 12$.
 Logo $FG = DF - EC = 7$ e $EF^2 = EG^2 + GF^2 \Leftrightarrow EF = 7\sqrt{2}$.

3. **(C)** Sejam $a \leq b \leq c$ os lados do triângulo e S a sua área. Temos que

$S = \frac{a \cdot 20}{2} = \frac{b \cdot 15}{2} = \frac{c \cdot 12}{2} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{3}{5}$ e $\frac{b}{c} = \frac{4}{5}$, ou seja, o triângulo tem lados proporcionais a 3, 4, 5 e portanto, seu maior ângulo interno é 90° .

4. **(D)** Veja solução do problema 25 do Nível 2.

5. **(D)** $4 \cdot 8 \cdot 18 \cdot 54 \cdot 192 = (2^2) \cdot (2^3) \cdot (2 \cdot 3^2) \cdot (2 \cdot 3^3) \cdot (2^6 \cdot 3) = 2^{13} \cdot 3^6$ Como o produto das incorretas é um cubo perfeito, os expoentes que aparecem na fatoração deste produto em primos devem ser múltiplos de 3. Logo a alternativa correta deve ser da forma $2^a \cdot 3^b$, onde $\frac{2^{13} \cdot 3^6}{2^a \cdot 3^b} = 2^{13-a} \cdot 3^{6-b}$ é tal que $13 - a$ e $6 - b$ são múltiplos de 3 $\Leftrightarrow a - 1$ e b são múltiplos de 3. Assim, a alternativa correta é a que apresenta $54 = 2 \cdot 3^3$.

6. **(D)** Considere os subconjuntos $\{1, 9, 17\}; \{2, 10, 18\}, \{3, 11, 19\}, \{4, 12, 20\}; \{5, 13\}; \{6, 14\}; \{7, 15\}; \{8, 16\}$. Dos quatro primeiros podemos tomar no máximo 2 elementos e dos demais no máximo 1 de modo a não haver dois números cuja diferença é 8. Logo o menor inteiro n é $4 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 1 = 13$.

$$7. \text{ (B) } a - b = 1^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) + 2^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + 3^2 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) + \dots + 1001^2 \left(\frac{1}{2001} - \frac{1}{2003}\right) =$$

$$\sum_{n=1}^{1001} n^2 \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) = \sum_{n=1}^{1001} \frac{2n^2}{(2n-1)(2n+1)} = \sum_{n=1}^{1001} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2(2n-1)(2n+1)}\right) =$$

$$\frac{1001}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{1001} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = 500,5 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{1001} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

Agora podemos observar que

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{1001} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{1001} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2003}\right) < \frac{1}{2}$$


e, portanto, o inteiro mais próximo de $a - b$ é 501.

8. (C) Quando a altura da areia no cone inferior é a metade da altura da areia no cone superior, passaram para o cone

$$\text{inferior } 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{19}{27} \text{ do volume total de areia.}$$


Portanto demora

$$\frac{19}{27} \cdot 1\text{h}30\text{min} = \frac{19}{27} \cdot 5400\text{s} = 3800\text{s} = 1\text{h}03\text{min}20\text{s}.$$



9. (A) Fazendo $n = 0$, temos $f(0) - f(2) = 9$
 Fazendo $n = 2$, temos $f(2) - 3f(0) = 25$
 Somando as duas igualdades, obtemos $-2f(0) = 34$, e logo $f(0) = -17$.
10. (B) É possível formar os números $10a + b$, $10b + a$, $10a + c$, $10c + a$, $10b + c$, $10c + b$ cuja soma é $22(a + b + c)$. Logo $22(a + b + c) = 484 \Leftrightarrow a + b + c = 22$. Então, sendo $0 \leq a < b < c \leq 9$, c é igual a 9.
 Listando as possibilidades, $\{6, 7, 9\}$ e $\{5, 8, 9\}$.
11. (C) Seja a o número de faces ocre do segundo cubo, que tem portanto $6 - a$ faces magentas. A probabilidade de as duas faces terem a mesma cor (Ocre e ocre ou magenta e magenta) é $\frac{5 \cdot a + 1 \cdot (6 - a)}{36} = \frac{4a + 6}{36} = \frac{2a + 3}{18}$.
 Temos $\frac{2a + 3}{18} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2a + 3 = 9 \Leftrightarrow a = 3$.
12. (B) Veja Solução do Problema 10 do Nível 2.
13. (B) Veja Solução do Problema 12 do Nível 2.
14. (D) Observemos que todos os números primos menores ou iguais a n aparecem na fatoração de $n!$. Como 17 não é fator de $n!$, temos $n < 17$. Além disso, como $n!$ tem 3 fatores 5 e os três primeiros múltiplos de 5 são 5, 10 e 15, que não têm mais de um fator 5, temos $n \geq 15$. Logo $n = 15$ ou $n = 16$.
 Como há $\frac{16}{2} = 8$ números pares menores ou iguais a 16, sendo $\frac{16}{4} = 4$ múltiplos de 4, $\frac{16}{8} = 2$ múltiplos de 8 e 1 múltiplo de 16, $16!$ admite $8 + 4 + 2 + 1 = 15$ fatores 2, logo $n = 16$.

15. (E)



Sendo \widehat{ABC} um dos ângulos internos do heptágono, $m(\widehat{ABC}) = \frac{(7-2) \cdot \pi}{7} = \frac{5\pi}{7} rad$. Assim,

como $m(\widehat{ABX}) = 90^\circ = \frac{\pi}{2} rad$, $m(\widehat{XBC}) = 2\pi - m(\widehat{ABC}) - m(\widehat{ABX}) = 2\pi - \frac{5\pi}{7} - \frac{\pi}{2} = \frac{11\pi}{14} rad$.

Sendo $BX = AB = BC$, o triângulo XBC é isósceles. Portanto

$$m(\widehat{BXC}) = \frac{\pi - m(\widehat{XBC})}{2} = \frac{\pi - \frac{11\pi}{14}}{2} = \frac{3\pi}{28} rad.$$

16. (C) Lembrando que ($|x| = x \Leftrightarrow x \geq 0$) e ($|x| = -x \Leftrightarrow x \leq 0$)

$$\sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = 2 \Leftrightarrow \left(\sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} \right)^2 = 2^2$$


$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+2\sqrt{x-1} + 2 \cdot \sqrt{(x+2\sqrt{x-1})(x-2\sqrt{x-1})} + x-2\sqrt{x-1} = 4 \\ x-2\sqrt{x-1} \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 - 4x + 4} = 2 - x \\ x^2 \geq 4x - 4 \\ x - 1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x-2| = -(x-2) \\ x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 \leq 0 \\ x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2$$

Logo o conjunto das raízes da equação é o intervalo $[1;2]$.

17. (B) Sejam $MN = h$ e $BN = x$. Pelas relações métricas no triângulo retângulo BMN ,

$$MN^2 = BN \cdot NC \Leftrightarrow h^2 = x(6-x) \text{ (I)}$$



Além disso, na segunda figura, os triângulos AMF e ADE são semelhantes, logo

$$\frac{AF}{AE} = \frac{MF}{DE} \Leftrightarrow \frac{x}{6} = \frac{h-2}{2} \Leftrightarrow h = \frac{x}{3} + 2. \text{ Substituindo em (I), obtemos}$$


$$\left(\frac{x}{3} + 2\right)^2 = x(6-x) \Leftrightarrow 5x^2 - 21x + 18 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = \frac{6}{5}.$$

Como o triângulo BMC não é isósceles, $x = \frac{6}{5}$.


Assim, considerando que a altura relativa ao lado AB do triângulo ABM mede x , a área desse

$$\text{triângulo é } \frac{AB \cdot x}{2} = \frac{2 \cdot \frac{6}{5}}{2} = \frac{6}{5}.$$




18. (E) Veja Solução do Problema 3 do Nível 2.

19. (B)



Do lado de fora da loja, uma pessoa avista 14 blocos, no máximo. São eles os 8 blocos na frente da loja, mais 2 na base inferior e mais 4 na base intermediária da pilha. Ele deixa de enxergar os 3 blocos marcados com um círculo na figura à esquerda. Destacamos na figura o plano vertical P , para mostrar que a aresta AB impede a visão da aresta vertical do bloco X , que fica totalmente oculto. A visão por cima também não alcança os 3 blocos marcados com um círculo, porque o plano de visão determinado pela aresta AC tem declividade $\frac{1}{8}$ (veja a figura abaixo).



20. (B) Veja Solução do Problema 23 do Nível 1.

21. (B) As 10 notas medianas são maiores ou iguais à maior das 10 piores notas e são menores ou iguais à menor das 10 melhores notas. Logo as 10 notas medianas são maiores ou iguais a 3 e menores ou iguais a 9.

Deste modo, sendo M a média da sala,

$$\frac{10 \cdot 3 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 9}{30} \leq M \leq \frac{10 \cdot 3 + 10 \cdot 9 + 10 \cdot 9}{30} \Leftrightarrow 5 \leq M \leq 7$$

22. (A) Veja a Solução do Problema 20 do Nível 2.

23. (D) Seja $N = x^2$, x inteiro positivo. Ao trocar cada algarismo de N pelo seu sucessor, obtemos um número 1 dezena e 1 unidade maior, ou seja, $N + 11$.

Como $N + 11$ é quadrado perfeito, $N + 11 = y^2$, sendo y inteiro positivo. Logo $x^2 + 11 = y^2 \Leftrightarrow (y - x)(y + x) = 11 \Leftrightarrow y - x = 1$ e $y + x = 11 \Leftrightarrow x = 5$ e $y = 6$. Logo $N = 5^2 = 25$, cuja soma dos algarismos é $2 + 5 = 7$.

24. (C) Vamos primeiro contar os agrupamentos 21 obtidos a partir de um par de números consecutivos tal que o primeiro termina com 2 e o segundo começa com 1, que são os seguintes 11 casos:

12 13, 102 103, 112 113, ..., 192 193.

Vamos agora listar os números que têm o agrupamento 21 no meio de sua representação decimal:

21, 121, 221, ..., 921

210, 211, ..., 219

Temos então 20 números nesse segundo caso, e portanto a resposta é $11 + 20 = 31$.

25. (D) Veja a solução do problema 21 do Nível 1.